


Неврология

Ишемический инсульт. Симптомы поражения сосудистых бассейнов.




Определение

Ишемический инсульт (ИИ) — клинический синдром, вызванный фокальным инфарктом головного мозга.

Критерии диагностики

- Патологоанатомические, нейровизуализационные или другие объективные данные, свидетельствующие о фокальном ишемическом повреждении в определенном сосудистом бассейне головного мозга
- или**
- Клинические данные, свидетельствующие о фокальном ишемическом повреждении в определенном сосудистом бассейне головного мозга, с симптоматикой, сохраняющейся ≥ 24 ч или до наступления летального исхода, причем другие возможные причины исключены.



Клиническая картина

Общемозговая симптоматика



Очаговая симптоматика


- Головная боль
- Тошнота/рвота,
- Нарушение уровня сознания (оглушение, сопор, кома)
- Изменение психического состояния

- Поражение каротидного бассейна
- Поражение вертебробазилярного бассейна

Кровоснабжение головного мозга

Каротидный бассейн

Вертебробазилярный бассейн



ПМА — передняя мозговая артерия, СМА — средняя мозговая артерия, ЗМА — задняя мозговая артерия, ПА — позвоночная артерия

Характерные очаговые симптомы

Каротидный бассейн

Артерия	Возможные симптомы
Передняя мозговая артерия	Контралатеральный гемипарез и/или гемигипестезия с преобладанием в ноге (по сравнению с рукой и лицом)
	Острые когнитивные нарушения, абулия, апраксия ходьбы
Средняя мозговая артерия	Контралатеральный гемипарез и/или гемигипестезия и/или гемианопсия
	Парез взора
	Острые когнитивные нарушения
	Доминантное полушарие: моторная и/или сенсорная афазия, аграфия, алексия, апраксия
	Недоминантное полушарие: неглект (в том числе анозогнозия)
Передняя ворсинчатая артерия	Гемипарез (часто плегия в руке), гемигипестезия (часто нарушение поверхностной чувствительности при сохранности глубокой), гемианопсия (часто секторальная), асимметрия лица и дизартрия
Глазная артерия	Острая безболевая монокулярная потеря зрения

Характерные очаговые симптомы

Вертебробазилярный бассейн

Артерия	Возможные симптомы
Задняя мозговая артерия	Гомонимная гемианопсия, алексия без аграфии (поражение затылочной доли), гемигипестезия, дистония/хореоатетоз, гиперпатия, острые когнитивные нарушения (вовлечение таламуса), гемипарез, поражение глазодвигательного нерва, парез вертикального взора (вовлечение среднего мозга)
Основная артерия	Угнетение сознания
	Тетрапарез (билатеральные моторные симптомы)
	Межъядерная офтальмоплегия, полуторный синдром, одно- или двусторонний парез горизонтального взора, точечные зрачки
	Поражение тройничного и лицевого нерва
	Острый вестибулярный синдром
Корковая слепота (дистальная окклюзия основной артерии)	

Характерные очаговые симптомы

Вертебробазилярный бассейн

Артерия	Возможные симптомы
Позвоночная артерия	Медиальный медуллярный синдром (ипсилатеральный парез языка, контралатеральный гемипарез и нарушение глубокой чувствительности);
	Латеральный медуллярный синдром (Валленберга – Захарченко): головокружение, атаксия, синдром Горнера, дизартрия, дисфагия, дисфония, икота, ипсилатеральная гипестезия на лице и/или контралатеральная гемигемипестезия
Мозжечковые артерии	Мозжечковая атаксия (туловищная и/или в конечностях)
	Острый вестибулярный синдром
	Односторонняя потеря слуха (окклюзия передней нижней мозжечковой артерии)
Перфорантные артерии	Лакунарные синдромы: изолированный двигательный дефицит, изолированный сенсорный дефицит, сенсорно-моторный дефицит, синдром дизартрии с неловкостью кисти, атактический гемипарез

Характерные очаговые симптомы

Вертебробазилярный бассейн

Артерия	Возможные симптомы
Ветви задней мозговой артерии	
Задняя ворсинчатая артерия	Контрлатеральная гемианестезия, гомонимная гемианопсия, амнестическая афазия, амнезия, алексия без аграфии, глагодвигательные нарушения
Передняя таламоперфорирующая артерия	Таламическая рука, тремор и хореоатетоз, таламические боли
Задняя таламоперфорирующая артерия	Правая и левая могут отходить от общего ствола (а. Першерона)) - двусторонний инфаркт во внутрипластинчатых ядрах таламуса (тяжелое нарушение сознания, глагодвигательные нарушения)
Артерия шпорной борозды	Контрлатеральная гомонимная гемианопсия, квадрантная гемианопсия или скотомы
Таламоколенчатая артерия	Синдром Дежерина-Русси - контрлатеральный гемипарез, гемианестезия, боль, гемиатаксия, астереогноз, хореоатетоз

Список литературы

- Акжигитов Р.Г., Алекян Р.Г., Алферова В.В. и др. Клинические рекомендации «Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака у взрослых»– 2024



reclin.ru

Reclin® Справочник сокращенных клинических рекомендаций

Клинические рекомендации | Гайды | Курсы | Практика | Калькуляторы | О проекте | Войти

Найдите клиническую рекомендацию за несколько секунд

Например: артериальная гипертензия

- Сокращенные клинические рекомендации**
Сократили полноразмерные рекомендации до самого важного – для практики и учебы.
- Структурированный материал**
Рекомендации четко структурированы – легко найти нужное сразу, без лишнего.
- Постоянно обновляется**
Еженедельно обновляем актуальные рекомендации.

Reclin®

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)

Открыть гайд

Получить доступ



Группа во Вконтакте
Клинические кейсы, материалы для практики, медицинские новости



Telegram-канал
Тесты для практики, анонсы мероприятий, общение с коллегами